

Perskindol Cool Kühl-Gel/Kühlspray/Kühlpflaster

VIFOR FRIBOURG

Pflanzliches Arzneimittel

AMZV

Was ist Perskindol Cool und wann wird es angewendet?

Perskindol Cool ist ein äusserlich anzuwendendes Heilmittel für eine wirksame Kältetherapie. Aufgrund dieser kühlenden Eigenschaften wird Perskindol Cool zur Schmerzlinderung und Verminderung der Anschwellung bei stumpfen Verletzungen wie *Zerrungen, Prellungen, Verstauchungen, Verrenkungen, Quetschungen und Blutergüssen* angewendet.

Perskindol Cool dringt rasch und rückstandsfrei in die Haut ein. Hände und Kleider bleiben fettfrei.

Wann darf Perskindol Cool nicht angewendet werden?

Nicht auf Schleimhäute und nicht auf offene, blutende Wunden applizieren! Wenn Sie zu Überempfindlichkeiten auf einen der Inhaltsstoffe neigen, sollten Sie Perskindol Cool nicht anwenden. Perskindol Cool darf an Kindern unter 4 Jahren sowie bei Patienten mit Asthma bronchiale nicht angewendet werden.

Wann ist bei der Einnahme/Anwendung von Perskindol Cool Vorsicht geboten?

Andere Vorsichtsmassnahmen bestehen bei vorschriftsgemässer Anwendung nicht.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie an Krankheiten leiden, Allergien haben, andere Medikamente, auch selbst gekaufte, anwenden.

Darf Perskindol Cool während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen/angewendet werden?

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Perskindol Cool?

Kühl-Gel

Die betroffenen schmerzenden Körperstellen mit dem Kühl-Gel in ausreichender Menge nach Bedarf mehrmals in dünner Schicht und ohne Druck auftragen. Bei Anwendung als Kompresse nur luftdurchlässiges Material verwenden.

Kühl-Spray

Die betroffenen schmerzenden Körperstellen mit dem Kühl-Spray in mehreren, kurzen Spraystössen aus zirka 15 cm Entfernung kreisend besprühen. Die Mindestentfernung von 15 cm der betroffenen Körperstelle zur Spraydose muss eingehalten werden.

Kühl-Pflaster

Die zu behandelnde Körperstelle muss sauber und trocken sein. Nach Entfernen des Schutzfilmes wird das Pflaster auf die zu behandelnde Stelle appliziert. Täglich maximal 3 Pflaster anwenden; die Behandlung mit dem Pflaster darf ohne Befragung des Arztes, der Ärztin maximal während 7 Tagen erfolgen.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt, der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, Perskindol Cool wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Perskindol Cool haben?

Für Perskindol Cool sind bisher bei vorschriftsgemässigem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Das mögliche Auftreten von leichten Hautreizungen bzw. Rötungen ist normalerweise unbedenklich.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht beschrieben sind, sollten Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin informieren.

Was ist ferner zu beachten?

Für Kinder unerreichbar aufbewahren. Nicht in Augennähe anwenden! Perskindol Cool darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in Perskindol Cool enthalten?

Kühl-Gel

1 g enthält: Levomenthol 70 mg, Hilfsstoffe, Color E 131, Aromatica.

Kühl-Spray

1 g enthält: Levomenthol 5 mg.

Treibgas: Propan/Butan, Dimethylether, Aromatica, Hilfsstoffe.

Kühl-Pflaster

1 Pflaster enthält: Levomenthol 175 mg, Hilfsstoffe.

Zulassungsnummer

54813, 53319, 53251 (Swissmedic).

Wo erhalten Sie Perskindol Cool? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien ohne ärztliche Verschreibung.

Gel-Tuben à 100 ml.

Spray-Dosen à 250 ml.

Pflaster à 5 Stück.

Zulassungsinhaber

Vifor SA, 1752 Villars-sur-Glâne.

Diese Packungsbeilage wurde im **Juni 1999** letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

Der Text wurde behördlich genehmigt und vom verantwortlichen Unternehmen zur Publikation durch die Documed AG freigegeben. © Copyright 2007 by Documed AG, Basel. Die unberechtigte Nutzung und Weitergabe ist untersagt. [30.09.2007]